

Re
Zur

Lane Medical Library

Statistik der Pneumonie.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde,

der

medizinischen Facultät zu Kiel

vorgelegt von

H. Schiel,

approb. Ärzte aus Blankenese.

Opponenten:

Cand. med. Georg Berendsen.

Cand. med. Hermann Schorkopf.

Kiel.

Druck von Schmidt & Klaunig.

1883.

Zur

Statistik der Pneumonie.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde,

der

medizinischen Facultät zu Kiel

vorgelegt von

H. Schiel,

approb. Arzte aus Blankenese.

Opponenten:

Cand. med. Georg Berendsen.

Cand. med. Hermann Schorkopf.



Kiel.

Druck von Schmidt & Klaunig.

1883.

Referent: Heller.

Imprimatur: Esmarch.

In der vorliegenden Arbeit habe ich nach den Sektions-Protokollen des Kieler pathologischen Instituts, welche Herr Professor Dr. Heller mir gütigst zur Verfügung gestellt hat, diejenigen Fälle von krupöser und Katarrhal-Pneumonie zusammengestellt, welche in den Jahren 1873 bis 1881 zur Autopsie gelangt sind.

Es wird mir im weiteren Verlaufe noch Gelegenheit werden, auf die leitenden Gesichtspunkte der Arbeit einzugehen, soweit dieselben sich aus den folgenden Tabellen nicht von selbst ergeben. Hier will ich zunächst nur im Allgemeinen bemerken, dass die krupösen und Katarrhal-Pneumonien im Verhältnis zur Anzahl der Sektionen überhaupt, ferner nach Alter und Geschlecht, endlich nach Monaten zusammengestellt worden sind.

Da das Material des Kieler pathologischen Instituts ein ziemlich gleichartiges ist, weil die Poliklinik und die akademischen Heilanstalten weitaus den grössten Teil der Sektionen liefern, so mögen die Tabellen und Zahlen, welche aufgeführt worden sind, vielleicht von etwas allgemeinerem Interesse sein.

Der Grund dafür, dass auch die Katarrhal-Pneumonie mit in den Kreis der Betrachtungen gezogen worden ist, liegt darin, dass diese beiden Affektionen vom pathologisch-histologischen Standpunkte aus nicht so scharf zu trennen sind, wie vielleicht vom klinischen.

Da die Katarrhal-Pneumonie meist etwas Sekundäres ist, eine Complication bei morbillen, tussis convulsiva, Bronchitis, Diphtherie und überhaupt allen jenen Krankheiten, mit welchen die Katarrhal-Pneumonie sich so häufig vergesellschaftet, so ist natürlich aus den Sektionsberichten neben jenen Krankheiten nur immer die Pneumonie verzeichnet.

Ebenso ist krupöse Pneumonie immer als solche verzeichnet, wenn dieselbe z. B. als terminale bei einer anderen Krankheit im Protokolle stand.

An der Hand der Tabellen will ich jetzt versuchen, die Resultate, welche ich gefunden habe, zu besprechen.

Es wird sich dabei empfehlen, krupöse und Katarrhal-Pneumonie nach einander zu betrachten. Einschalten muss ich hier, dass die geringen Differenzen von Tab. II und III, resp. IV und V, in der Gesamtzahl von Pneumonien sich daraus ergeben, dass bei dem Verzeichnis nach Monaten nur das Geschlecht in Betracht gezogen worden ist.

Zunächst habe ich sämtliche Sektionen, welche in den Jahren von 1873 bis 1881 vorgekommen sind, zerlegt, nach Alter und Geschlecht. Die Lebensjahre vom 1. bis zum 90. habe ich verzeichnet gefunden. Wo Angaben über Alter oder Geschlecht fehlten, habe ich diese Fälle in eine besondere Gruppe gebracht.

In den meisten derartigen Statistiken wird verglichen die Gesamtzahl der beobachteten Fälle einer Krankheit mit dem auf die einzelnen Geschlechter und Altersgruppen fallenden Prozentsatz, eine Methode, die völlig wertlos ist, da sich aus solchen Zahlen nicht ergibt, wie viele Individuen derselben Klasse von der Krankheit nicht befallen wurden. Am zweckmässigsten wäre ein Vergleich mit der Zahl aller lebenden Individuen derselben Gruppe. In Ermangelung dessen ist immer noch besser, die beobachteten Fälle einer Krankheit mit der Zahl aller sonst zur Sektion gekommenen Individuen zu vergleichen; dies wird hier geschehen.

Nach Tab. I sind mit Ausschluss der 144 Sektionen ohne nähere Angabe 1437 männlichen und 1079 weiblichen Geschlechts gemacht worden. Unter diesen waren nach Tab. II 107 krupöse Pneumonien bei den Männern und 50 bei den Weibern, im Durchschnitt also 7,44% beim männlichen und 4,63% beim weiblichen Geschlechte.

Ganz erheblich differiren die einzelnen Jahre in der Menge der Fälle, die zur Sektion gelangt sind (cfr. Tab. II u. III). Obenan steht das Jahr 1873 mit einer Zahl von 24, was einem Prozentsatz von 10,04 entspricht. Die niedrigste Zahl zeigt das Jahr 1877 mit 11 Fällen und einem Prozentsatz von 3,90. Bemerkenswert ist, dass das Jahr 73 bei der geringsten Zahl von Sektionen (cfr. Tab. I) weitaus am meisten Pneumonien hat. Zwischen den Jahren 73 und 77 nehmen die übrigen Jahre eine Mittelstellung ein. Der Durchschnittsprozentsatz für die neun Jahre ist 6,09.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung des Lebensalters, so sehen wir, dass die krupöse Pneumonie zwar in jeder Altersklasse

vorkommt, dass aber die Frequenz in den einzelnen Klassen sehr verschieden ist. Unter der grossen Zahl von 534 Sektionen im ersten Lebensalter stehender Individuen ist nur 9 Mal krupöse Pneumonie gefunden. In der darauf folgenden Altersklasse vom 2-5 Jahre finden wir unter 344 Sektionen 13 Mal, dann in den Altersklassen vom 6.—10., 11.—20., 21.—30. Jahre auf 93, 161, 312 Sektionen resp. 3, 4, 13 Mal krupöse Pneumonie. Dann steigt aber in der darauf folgenden Klasse vom 31—40 Jahre die Zahl auf das Doppelte bei der gleichen Anzahl von Sektionen, nemlich auf 310 Sektionen 27 Mal als Ergebnis krupöse Pneumonie. Ueberhaupt liefern die drei Decennien vom 31. — 60. Jahre weitaus die grössten Zahlen und besonders das männliche Geschlecht. (cfr. Tab. I u. II). Am auffallendsten ist dieses Verhältniss im Decennium 51—60. Hier kommen auf 139 Sektionen männlichen und 80 weiblichen Geschlechts überhaupt resp. 25 und 2 Mal krupöse Pneumonie als Resultat.

Ueberhaupt sind in den letzten Altersklassen die Zahlen und Procente sehr hoch. Dies erhellt namentlich aus Vergleichung der ersten Lebensjahre mit den letzten. Dort nur 1,68 und 3,77% aller Secirten mit dem Resultate krupöse Pneumonie, hier 11,30 und 18,69.

Bei der Einteilung der Pneumonien nach Monaten (conf. Tab. III) sehen wir das Maximum im Dezember, das Minimum im Juli. Die übrigen Wintermonate ausser dem Dezember und auch die Monate März, April, Mai sind ziemlich gleich unter sich, im Juni folgt dann ein bedeutender Abfall, im Juli wird das Minimum erreicht, worauf sich dann in den folgenden Monaten August bis October die Zahlen wieder allmählich heben, um vom November zum Dezember schroff zu steigen.

Auffallend ist mir bei dieser Zusammenstellung gewesen, dass diese Maximal- und Minimal-Monate sich decken mit den Maximal- und Minimal-Monaten, welche Jürgensen¹⁾ für das insulare Klima angiebt, obgleich nach demselben Autor die Ostseeküsten, also auch Kiel, sich dem continentalen Typus anschliessen sollen, für den andere Monate mit Maximum und Minimum angegeben sind.

Diese Beobachtung findet eine Unterstützung, wenn man die Schwankungen des Barometers, Maxima und Minima im Mittel, in den einzelnen Monaten mit dem Steigen und Fallen der Pneumonie vergleicht. Es scheint eine Thatsache zu sein, dass starke Schwankungen des Barometers die Frequenz der Pneumonie be-

¹⁾ Krankheiten des Respirationsapparates II S. 14 in v. Ziemssen's Handbuch d. spez. Pathol. u. Therapie.

günstigen, während bei mehr gleichmässigem Barometerstande die Frequenz herabgemindert wird. In der beigegebenen Kurventafel, welche die Barometerschwankungen in den einzelnen Monaten aus einer Reihe von Jahren berechnet darstellt,¹⁾ figuriren die Wintermonate, unter diesen der Dezember mit den grössten barometrischen Schwankungen. In den Sommermonaten Juli namentlich nähern sich die Maxima und Minima einander beträchtlich. Die Kurven sind leicht verständlich und bedürfen keines weiteren Commentars.

Nach Vierteljahren geordnet ist also das Maximum im Dezember bis Februar, dann folgt März bis Mai, dann September bis November, endlich Juni bis August. Endlich nach Halbjahren sind im Juni bis November am wenigsten, in December bis Mai am meisten Pneumonien und zwar ist das Verhältniss ziemlich genau wie 1 : 2.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der Katarrhal-Pneumonie. Aus Tab. IV sehen wir, dass die Zahl der Katarrhal-Pneumonien eine viel grössere ist, als die der krupösen.

Auf 1437 Sektionen männlichen Geschlechts kommt 214 Mal als Befund Katarrhal-Pneumonie gleich 14,87%, während auf 1079 Sektionen weiblichen Geschlechts 163 Mal gleich 15,10% jener Befund kommt, also ein geringes Ueberwiegen beim weiblichen Geschlechte.

Die einzelnen Jahre differiren zwar auch ziemlich unter einander (cfr. Tab. IV u. V.) aber nicht so wie bei krupöser Pneumonie, jedenfalls ist das Verhältniss so, dass mit Zunahme der Sektionen auch die Menge der Katarrhal-Pneumonien steigt, nicht aber, dass bei einem Jahr mit wenig Sektionen unverhältnismässig die Zahl der Pneumonie-Fälle vermehrt ist.

Wenn man an dem Gedanken festhält, dass die Katarrhal-Pneumonie meist etwas Sekundäres ist und namentlich häufig die Kinderkrankheiten begleitet, so muss natürlich in Jahren, wo jene stärker auftreten, auch die Zahl der Pneumonien wachsen.

Als solche Jahre sind nach den Berichten des Herrn Professor Dr. Edlefsen über die medicinische Poliklinik²⁾ namentlich zu nennen 1876, 1878, 1879, 1880, 1881. Am geringsten ist die Zahl im Jahre 1873 nämlich 25, in Prozenten 10,45, am grössten im Jahre 1880 nämlich 57, in Prozenten 16,52. Der Durchschnittssatz für die neun Jahre ist 14,62.

¹⁾ Der Chronik der Universität Kiel 1873 entnommen.

²⁾ Chronik der Universität Kiel 1873—81.

Aus dem oben Erwähnten folgt weiter, dass die ersten Lebensjahre besonders stark vertreten sein müssen, und so sehen wir denn auch, dass das Lebensalter vom 1. -- 5. Jahre nahezu $\frac{2}{3}$ der Gesamtmenge umfasst.

Die ferneren Decennien bis zum 51.—60. sind unter einander ziemlich gleich. In den letzten Decennien vom 61.—90. findet dann wieder ein erhebliches Steigen Statt.

Bei der Zusammenstellung nach Monaten fällt ein ausgesprochenes Minimum auf den September. Vom Oktober zum November steigt die Zahl um das Doppelte. Die Monate November bis März sind ziemlich gleich unter sich, so dass man von einem Maximal-Monat nicht sprechen kann. Vom April bis August fällt dann die Zahl der Pneumonien allmählich, ein geringes Steigen im Juli abgerechnet. Nach Vierteljahre ist das Maximum im December bis Februar, dann folgt März bis Mai. Die beiden Vierteljahre Juni bis August, September bis November weichen in den absoluten Zahlen unerheblich von einander ab. Im Verhältniss zur Anzahl der Sektionen ist aber September bis November das stärker belastete.

Nach Halbjahren zusammengestellt ist December bis Mai am stärksten, Juni bis November am geringsten belastet. Das Verhältniss ist annähernd 4:3. (conf. Tab. V.)

Zum Schluss gestatte ich mir, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Heller für die freundliche Anregung zu dieser Arbeit und für die liebenswürdige Unterstützung, welche er mir bei derselben hat zu Theil werden lassen, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.


Tabelle I.

Jahr	Jahr 0-1		Jahr 2-5		Jahr 6-10		Jahr 11-20		Jahr 21-30		Jahr 31-40		Jahr 41-50		Jahr 51-60		Jahr 61-70		Jahr 71-80		Jahr 81-90		Ohne nähere Alters- und Ge- schlechts- angabe	Summa.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
1873	17	14	8	10	4	2	7	7	20	14	22	17	11	12	18	8	10	8	6	4	0	1	19	239
1874	31	25	13	16	6	3	12	11	19	22	17	11	10	9	15	12	12	4	2	5	0	3	9	267
1875	21	37	24	16	5	4	15	4	24	22	25	14	20	9	12	5	11	5	6	9	1	0	6	295
1876	28	24	12	17	4	7	9	10	22	13	20	12	20	8	15	7	13	5	6	2	0	3	6	263
1877	30	26	21	15	4	2	10	8	17	8	28	13	15	12	14	8	8	7	7	9	3	1	16	282
1878	35	29	31	18	4	6	12	9	15	19	18	10	14	12	19	4	17	4	9	9	0	0	18	312
1879	39	25	27	11	4	4	7	9	15	13	12	13	28	11	18	11	8	2	2	4	1	0	15	279
1880	45	31	18	18	9	3	8	7	15	17	20	16	19	16	14	10	18	12	9	8	1	0	31	345
1881	39	38	39	30	11	11	8	8	25	14	26	16	12	10	14	15	16	8	4	6	2	2	24	378
Sa.	285	249	193	151	51	42	88	73	170	142	188	122	151	99	139	80	113	55	51	56	8	10	144	2660
Summa	534	344	93	161	312	310	250	219	168	107	18													
% aller Seciren	20,07	12,9	3,49	6,06	11,72	11,65	9,39	8,23	6,31	4,02	0,67													

Tabelle V.

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep- tember	Oc- tober	No- vember	De- cember	Summa	Katarrhal- Pneumonie
	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.		
1873	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	25	10,45
1874	—	2	4	1	1	1	—	1	1	2	1	2	29	10,89
1875	—	3	4	2	1	2	—	—	1	1	3	1	44	14,61
1876	4	2	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	44	16,73
1877	7	2	2	1	2	2	2	2	1	2	4	2	45	15,95
1878	4	2	2	2	5	1	3	2	—	1	6	3	46	14,71
1879	1	2	4	3	2	1	1	2	2	1	2	1	45	16,12
1880	5	3	1	2	4	1	4	2	4	1	2	3	57	16,52
1881	6	2	4	2	1	—	2	1	1	4	1	3	54	14,28
Sa.	28	19	27	20	12	14	9	13	10	10	30	18	389	14,02
Summa	44	41	42	34	26	23	30	24	14	21	44	46		
Zahl all. Sectionen	218	200	254	222	238	224	236	242	178	207	206	235	cfr. Jan. bis Febr.	
" 9	20,48	20,5	16,53	15,31	10,92	10,26	12,71	9,91	7,81	10,11	20,18	19,67		
Sa. d. Pneumonie	131	102	102	102	102	77	77	77	79	79	79	79	nach Quartalen	
Sa. d. Section	653	714	714	714	714	702	702	702	591	591	591	591		
" 0	20,05	20,05	14,28	14,28	14,28	16,391	16,391	16,391	13,391	13,391	13,391	13,391		
Sa. d. Pneumonie	233	233	233	233	233	156	156	156	156	156	156	156		
Sa. d. Section	1367	1367	1367	1367	1367	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293		
" 0	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	nach Semestern	

Grafische Darstellung:



- I. Barometer-Maxima und Minima nach den Beobachtungen von 1854—73 in Kiel.
- II. Kurve der Max. u. Min.-Barometer-Abstände 1854—73 in Kiel.
- III. Krupöse Pneumonien von 1873—81 nach Prozentsen für die einzelnen Monate.

V i t a.

Ich, Hugo August Hermann Schiel, bin geboren am 20. Januar 1855 in Blankenese (Holstein). Das Gymnasium in Altona besuchte ich erst von Secunda an, vom Jahre 1871 bis Ostern 1875. Nach bestandener Maturitätsprüfung studirte ich von 1875 bis 1877 in Kiel, bestand daselbst das Tentamen physicum, ging dann je ein Semester nach Tübingen und München. Im Sommer 1878 kehrte ich nach Kiel zurück und diente 6 Monate mit der Waffe. Im Winter 1879/80 meldete ich mich zur Staatsprüfung, wurde aber durch Krankheit daran verhindert, mich derselben zu unterziehen. Ich hielt mich dann aus Gesundheitsrücksichten ein Jahr in der Schweiz auf und meldete mich 1880/81 zur Staatsprüfung. Im Februar 1881 bestand ich das Schlussexamen. Am 1. September nahm ich eine Stelle als Assistenzarzt an der Irrenheilanstalt Wehnen in Oldenburg an. Am 2. November 1882 bestand ich das Rigorosum.

T h e s e n.

1. Morphinum nützt bei maniakalischen Zuständen als Beruhigungsmittel nichts, wirkt eher im entgegengesetzten Sinne.
2. Die krupöse Pneumonie ist eine Infectiouskrankheit.
3. Die an Stelle der originalen Lister'schen antiseptischen Methode gesetzten Verfahren haben keine principielle Bedeutung.

